

ツムラの漢方内服液

葛根湯

かつ こん とう

第2類医薬品

ツムラの漢方内服液

発熱やさむけがしてきたら…

かぜの初期症状、
頭痛、鼻かぜに

葛根湯


かつ こん とう

第2類医薬品

体力中等度以上の方に



30mL×3本(1日分)



4 987138 322043

C10CD 25φ

第2類医薬品

押してあける

【販売名】 ツムラ漢方内服液葛根湯

【使用上の注意】

【相談すること】

1.次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦または妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品(箱)を持って医師または薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のたるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2)1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合。

3.長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください。

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 次の量を、食間に服用してください。

年 齢	1回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

服用前によく振ってから服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

本剤は1回1本の服用で飲みきり、のみ残しのないようにしてください。

【保管および取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用をさへ品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

【包 装】 30mL×3本入(1日分)

製造番号

使用期限

発売元



株式会社ツムラ

東京都港区赤坂2-17-11
〒107-8521

お客様相談窓口

電 話 0120-329-930

<http://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214番地1

【成分・分量】

本品1日量90mL(30mL×3本)中、以下の生薬より抽出した葛根湯エキス8.3gを含有します。

日局カコン.....8.0g	日局ジャクウ.....3.0g
日局マオウ.....4.0g	日局カンゾウ.....2.0g
日局タイソウ.....4.0g	日局ショウキウ.....1.0g
日局ケイ.....3.0g	

添加物として転化型液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、日局ハチミツ、日局安息香酸ナトリウム、日局パラオキシ安息香酸ブチル、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、日局クエン酸水和物、日局炭酸水素ナトリウム、香料、エチルパニリン、グリセリン、パニリン、プロピレングリコールを含有します。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



箱

金 属 : キャップ
ガ ラ ス : 瓶

捨てる際は、自治体で指定された方法で廃棄してください。

ツムラの漢方内服液

かぜの初期症状 頭痛、鼻かぜに

葛根湯

かっこんとう

第2類医薬品

30mL



【販売名】 ツムラ漢方内服液葛根湯

【成分・分量】 本品1日量90mL(30mL×3本)中、以下の生薬より抽出した葛根湯エキス8.3gを含有します。

日局カッコン…8.0g	日局シャクヤク…3.0g
日局マオウ…4.0g	日局カンゾウ…2.0g
日局タイソウ…4.0g	日局ショウキョウ…1.0g
日局ケイヒ…3.0g	

【効能・効果】 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 次の量を、食間に服用してください。

年 齢	1回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

服用前によく振ってから服用してください。

【注意】(1)服用に際しては箱の裏面の説明文書をよくお読みください。(2)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

発売元



株式会社ツムラ

東京都港区赤坂2-17-11
〒107-8521

お客様相談窓口

電 話 0120-329-930
<http://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元 大同薬品工業株式会社 奈良県葛城市新村214番地1

製造番号

使用期限