

第2類医薬品 ツムラの漢方内服液

葛根湯 2

かっこんとう

ツムラの漢方内服液

かぜの初期症状

さむけ、発熱、頭痛、
鼻水、のどの痛み

葛根湯 2

かっこんとう




45mL×2本
(1日分)



1日2回

第2類医薬品

かぜの初期症状
さむけ、発熱、頭痛、
鼻水、のどの痛み



かぜの初期症状
さむけ、発熱、頭痛、
鼻水、のどの痛み

葛根湯

かっこんとう

2

45mL

第2類医薬品



A08FD 25φ



4 987138 322340

第2類医薬品

押してあける

【販売名】 ツムラ漢方葛根湯液2

△【使用上の注意】

※【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください

■【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品(箱)を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する。顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる。手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

かぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

【用法・用量】

次の量を、食間に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないでください	

服用前によく振ってから服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

本剤は1回1本の服用で飲みきりのみ残しないようにしてください。

【保管および取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

【包 装】 45mL×2本入(1日分)

【成分・分量】

本品1日量90mL(45mL×2本)中、以下の生薬より抽出した葛根湯エキス8.3gを含有します。

日局カコン…8.0g	日局ジャク…3.0g
日局マオウ…4.0g	日局カンゾウ…2.0g
日局タイソウ…4.0g	日局ショウキョウ…1.0g
日局ケイヒ…3.0g	

添加物: 転化型液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、ハチミツ、安息香酸Na、バラベン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸水和物、炭酸水素Na、香料、その他4成分

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931

製造
番号
使用
期限

発 売 元

株式会社 ツムラ
東京都港区赤坂2-17-11
T107-8521

お客様相談窓口
☎0120-329-930
<http://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元

大同薬品工業株式会社
奈良県葛城市新村214番地1



箱

金 属 : キャップ
ガラス : 瓶

捨てる際は、自治体で指定された方法で廃棄してください。