

【使用上の注意】【相談すること】

次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。◎しばらく服用しても症状の改善がみられない場合

【成分・分量】 本品1日量(100mL)中
ローヤルゼリーチンキ100mg、チアミン
硝酸化物10mg、リボフラビンリン酸エ
ステルナトリウム3mg、ピリドキシン塩
酸塩20mg、ニコチン酸アミド20mg、
無水カフェイン50mg、タウリン1600mg、
カルニチン塩化物100mg、トチュウ流
エキス0.1mL、クコシ流エキス0.1mL
[アルコール0.3mL以下]


添加物：白糖、転化型液糖(白糖・果糖・
ブドウ糖)、ハチミツ、クエン酸水和物、
酒石酸、DL-リンゴ酸、クエン酸ナトリ
ウム水和物、安息香酸ナトリウム、パラ
ベン、香料、エチルパニリン、パニリン、
プロピレングリコール、D-ソルビトール
●本剤に配合されているリボフラビン
リン酸エステルナトリウムにより尿が黄
色になることがあります。

販売名：ハイクロンミン-DII

第3類医薬品 100mL

ハイ クロンミン®-DII

第3類医薬品



製造 大 同 薬 品 工 業 株 式 有 限 公 司
販売元 奈良県葛城市新村214番地1
お客様相談室 0745-62-5031

製造番号

使用期限

【効能・効果】

滋養強壮。虚弱体質。肉体疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期
などの場合の栄養補給。

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(100
mL)を服用する。◎定められた用
法・用量をお守りください。◎小
児には服用させないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない、なる
べく涼しい所に保管してください。
2.小児の手の届かない所に
保管してください。3.使用期限
の過ぎた製品は服用しないでく
ださい。

生成成分を含むため、まれに沈殿を
生じることがありますが、服用に支障
はありません。よく振ってから服用し
てください。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

¥263(税抜¥250)

A09JD