

服用に際しては、瓶の表示を必ずお読みください。

**【使用上の注意】 相談すること**

(1)服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。[皮膚:発疹、消化器:胃部不快感](2)しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【効能・効果】**●滋養強壮●虚弱体質●肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

**【用法・用量】**成人(15歳以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。

15歳未満は服用しないでください。

**〈用法・用量に関連する注意〉**(1)よく振ってから服用してください。(2)用法、用量を厳守してください(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等にご注意してください)。

**【保管及び取扱い上の注意】**(1)直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元 **日野薬品工業株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

お問い合わせ先/お客様相談窓口  
☎ 0748-52-1232 受付時間 9時~17時  
(土、日、祝日を除く)

製造 **大同薬品工業株式会社**  
販売元 奈良県葛城市新村214-1

指定医薬部外品

タウリン  
**2000**mg

3種のビタミン配合

ビタミン  
**B<sub>1</sub>**

ビタミン  
**B<sub>2</sub>**

ビタミン  
**B<sub>6</sub>**

L-アルギニン塩酸塩

リフレngoール2000

販売名:リフレngoール2000 100mL

**【成分・分量】**

1日量(100mL)中

チアミン硝酸塩(ビタミンB<sub>1</sub>硝酸塩) 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル) 5mg(リボフラビンとして3.9mg)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) 6mg、ニコチン酸アミド 20mg、無水カフェイン 50mg、タウリン 2000mg、L-アルギニン塩酸塩 100mg

添加物として果糖ブドウ糖液糖、クエン酸水和物、安息香酸ナトリウム、香料、エタノール、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール、L-メントール、グリセリンを含有します。

**〈成分・分量に関連する注意〉**

本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB<sub>2</sub>によるものです。

使用  
期限

製造  
番号



金属:キャップ ガラス:瓶

A26AT