

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

シラミ駆除医薬品



外用薬

スミスリン[®]L シャンプータイプ

SUMITHRIN[®]L Shampoo-type

スミスリンLシャンプータイプは、人体に寄生するシラミの駆除に優れた効果のある医薬品です。

ヒトジラミには、アタマジラミ、ケジラミ、コロモジラミの3種類があり、皮膚から吸血して、かゆみ、湿疹などを起こします。特に保育・幼稚園児や小学生の間で集団発生するシラミはアタマジラミです。

スミスリンLシャンプータイプQ & Aのコーナーに記載している正しい使用方法に従って、シラミを早く退治してください。

〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の場合は使用しないでください。
頭皮又は適用部位に湿疹、かぶれ、ただれ等の症状がある場合
2. 内服しないでください。
3. 頭髪の洗浄を目的として使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に、医師又は薬剤師にご相談ください。
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人
(2)薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師にご相談ください。
(1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

(2)3~4回使用しても改善がみられない場合

3. 次の場合は直ちに医療機関を受診してください。
(1)誤って本剤をのみこんだ場合
(2)誤って目に入り、水又はぬるま湯で洗い流した後も症状が重い場合

〔効能又は効果〕

シラミの駆除

〔用法及び用量〕

次の量を、シラミの寄生している部位に使用してください。

使用する部位・場所	1回量	使用 方法
頭 髪	10~20mL程度	1. シラミが寄生している頭髪又は陰毛を水又はぬるま湯であらかじめ濡らす。 2. 1回量を用い、毛の生え際に十分いきわたるように又全体に均等になるようにシャンプーする。
陰 毛	3~5mL程度	3. シャンプーして5分間放置した後、水又はぬるま湯で十分洗い流す。 4. この操作を1日1回、3日に1度ずつ(2日おきに)3~4回繰り返す。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)本剤は頭髪又は陰毛等、目的とする局所にのみ使用し、局所以外の人体露出部には使用しないでください。
- (3)使用に際して、目、耳、鼻、口、尿道、膣、肛門等に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。
- (4)本剤の使用後、手やくし等は、水又はぬるま湯、石けん等で洗ってください。
- (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6)ヘアマニキュアなどで毛髪を染めている場合、本剤により染毛剤が溶け出して脱色されることがあります。また、溶けた染毛剤で衣服などが汚れるおそれがありますので注意してください。
- (7)食品、食器、おもちゃ、観賞魚等にかからないようにしてください。
- (8)毛に固着した卵や卵のぬけがらは、本剤を使用しただけでは除去できません。気になる場合には、目の細かいすきぐし等ですいて取り除いてください。

〔成分及び分量〕

成 分	含量 (1mL中)
フェノトリン (スミスリン [®])	4mg

添加物としてアルキルジメチルアミンオキシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポリソルベート80、エデト酸ナトリウム、pH調整剤及び香料を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

本剤はシラミ駆除専用の医薬品です。通常のシャンプー等と区別して保管し、頭髪の洗浄の目的には使用しないでください。

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
- (3)使用後はキャップをきれいに洗浄し、布等でよくふいた上で、確実に閉めてください。
- (4)他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因となったり、品質が変わることがあります。)
- (5)使用期限(外箱、ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一旦開封した後は、すみやかに使用してください。
- (6)容器内に水道水や他の液剤を混入させないでください。(本剤の効力が変わることがあります。)
- (7)濁りを生じている場合は使用しないでください。
- (8)使用済みの空容器等は、自治体の取り決めに従って廃棄してください。



【包装】 80mL

【スミスリンLシャンプータイプQ & A】

Q1：シラミとはどんなものですか？

人に寄生するシラミには、アタマジラミ、ケジラミ、コロモジラミの3種類があり、子供たちの間で集団発生するのはアタマジラミです。アタマジラミは、毛髪に寄生し、頭皮から吸血してかゆみや湿疹などを起こします。また、毛髪に固着した卵(0.5mm前後)を点々と産み付けるので比較的容易に発見できます。卵のぬげがらはフケと見まちがいやすいものですが、毛にこびりついて取りにくいので簡単に判別できます。

ケジラミは、主に陰毛に寄生して陰部に強いかゆみをきたしますが、アタマジラミとは異なる系統のシラミで、通常頭髪に寄生することはありません。

■アタマジラミ



■ケジラミ



■コロモジラミ



①アタマジラミ

- 体長：2～4ミリ
- 感染部位：頭髪
- 主な感染経路：髪との接触、ロッカー・脱衣かごの使用など

②ケジラミ

- 体長：1～2ミリ
- 感染部位：主として陰毛
- 主な感染経路：性行為など

③コロモジラミ

- 体長：2～3ミリ
- 感染部位：衣類の縫い目など

■アタマジラミの卵



Q2：スミスリンLシャンプータイプの正しい使い方は？
使用方法(頭髪に使用する場合)

①あらかじめ水又はぬるま湯で頭髪を少し濡らしてください。



②キャップの目盛を参考に1回量として10～20mLご使用ください。

③毛の生え際に十分いきわたるように又全体に均等になるようにシャンプーしてください。



④そのまま5分間待ってください。(頭にタオルを巻くなどして目、耳、鼻、口等に入らないように注意してください。小さいお子さまの場合はシャンプーハットをお使いになるのもよい方法です。)



⑤水又はぬるま湯で薬液を十分に洗い流してください。そのあとは通常のシャンプー又はリンスを使用してもかまいません。(すすぎ洗った水やぬるま湯が肩先や身体にかかった場合、よく洗い流してください。)



⑥この操作を1日1回、3日に1度ずつ(2日おきに)、3～4回繰り返します。(この間に通常のシャンプー又はリンスを使用してもかまいません。)



Q3：どうして3日に1度ずつ、3～4回使わなければいけないの？
卵は約7日でふ化します。スミスリンLシャンプータイプはシラミの卵に浸透するため、ある程度の殺卵効果が期待できますが、ふ化してくる幼虫も多少ありますので、ふ化してきたシラミの幼虫を順番に退治し、4回目の使用に当たる10日目には全てのシラミを駆除するという方法を用いているからです。

Q4：2日間隔のあいだに卵からかえったシラミが卵を産むことはありませんか？
ありません。幼虫の期間は、7～16日です。幼虫が卵を産むことはありません。



Q5：4回使用してもまだ残っている卵はどうしたらいいの？
それは多分シラミの幼虫がふ化したあとの卵のぬげがらです。卵はぬげがらになってもしっかりと毛にこびりついていて、とれにくいので、添付の目の細かい「すきぐし」でていねいに取ってあげてください。

生きた卵は充実感があって、爪ではさんでつぶすとプシュとつぶれます。スミスリンLシャンプータイプを用法通りに使用後に、卵と思われるものを爪ではさんでプシュとつぶれなくなり、かゆみもなくなっていけば本剤を使い続ける必要はありません。また卵のぬげがらと見まちがいやすいヘアーキャスト(フケと脂肪分の固まり)は指でつまんで簡単に取り除くことができます。

Q6：髪の毛が長い場合は短く切ったほうがいいのか？
シラミは毛根近くにおいて、血を吸って生息します。ですから毛の根元付近に本剤がいきわたるようにすればよいので、別に髪を切る必要はありません。

お問い合わせ先

大日本除虫菊株式会社 お客様相談室

電話：06-6441-1105

(受付時間：9:00～17:00 土・日・祝日を除く)

製造販売元



大日本除虫菊株式会社

〒550-0001

大阪市西区土佐堀1丁目4番11号