

生薬製剤 軽い尿もれ・頻尿用薬

ハルンケア[®] Harnicare 内服液



■特徴

1. 8種類の生薬(ジオウ、タクシャ、ボタンピ、ブクリョウ、サンシュユ、サンヤク、ケイヒ、炮附子)から抽出・濃縮し、更にエタノールを加え、澱粉等を分離除去した後、エタノールを蒸発除去して製したエキスを含有する生薬製剤です。
2. 体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う方の“軽い尿もれ”、“頻尿(小便の回数が多い)”、“残尿感”、“尿が出渋る”の症状を緩和します。
3. 服用しやすい液剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人
- (2) 下痢しやすい人
- (3) 次の症状のある人
 - 脊髄損傷や痴呆等により、「尿がもれたことに気が付かない」
 - 前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (5) 漢方製剤等を服用している人(含有生薬の重複に注意する)
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください。

※(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛、便秘
泌尿器	尿閉
その他	頭痛、のぼせ、めまい、どうき、息切れ、悪寒、浮腫

- (2) 14日間位服用しても症状がよくなる場合

■ 効能・効果

体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状の緩和

●軽い尿もれ ●頻尿(小便の回数が多い) ●残尿感 ●尿が出渋る

■ 用法・用量

次の量を朝夕食前又は食間^{注)}に服用してください。

年 齢	成人(15歳以上)	小児(15歳未満)
1回量	1本(30mL)	服用しないでください。
1日服用回数	2回	

注)食間とは食事と食事の間という意味で、食後約2時間のことです。

●定められた用法・用量を厳守してください。

■ 成分・分量

1日量2本(60mL)中：

生薬エキスH……11mL

(ジオウ ……5g ブクリョウ ……3g ケイヒ ……1g
タクシャ ……3g サンシュユ ……3g 炮附子 ……1g
ボタンピ ……3g サンヤク ……3g より抽出)

添加物としてグリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、トウモロコシデンブ、香料を含有します。

◆本剤は生薬成分を含むため、経時的に沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用してください。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱及びラベルに記載しています。
- (5) 開栓されている製品は服用しないでください。開栓後は保存しないでください。

■ 包装

1箱 2本(30mL× 2本)入り

1箱10本(30mL×10本)入り

■ お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 **大鵬薬品工業株式会社** お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号：03-3293-4509

受付時間：9:00～17:30(土、日、祝日を除く)