

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読み下さい。また、必要時に読めるように大切に保管して下さい。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

連用しないで下さい

(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります)

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい)

- (3) 高齢者
- (4) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気、嘔吐、痔出血
- (5) 次の診断を受けた人
心臓病

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

その他の注意

次の症状があらわれることがあります
立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感



三ツ星 ダイヤ 浣腸30

第2類医薬品

キャップ式

三ツ星 ダイヤ 浣腸30

第2類医薬品

30g×2個入

製造販売元

ダイヤ製薬株式会社

奈良県橿原市上品寺町515

発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

お客様相談室TEL:0744-21-5588

受付時間 9:00～17:00(土日、夜間を除く)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3) 他の容器に入れ替えない下さい
(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります)
- (4) 使用期限がすぎたものは使用しないで下さい

使用期限

製造番号



1301A04
2013年1月改訂 第4版

【効能・効果】 便秘

【用法・用量】 12歳以上 1回量(1個)を直腸内に注入し、それで効果の見られない場合にはさらに同量をもう一度注入する

＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守して下さい
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります)
- (3) 12歳未満の小児には、使用させない下さい
- (4) 洗腸のみで使用して下さい

【成分・分量】 1個(30g中) 濃グリセリン 15g
(添加物としてベンザルコニウム塩化物含有)

副作用報告書救済制度の関与先
 (株)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhinshu/>
 電話 0120-149-931



※ 無理に挿入し直腸粘膜を傷めたり、お尻の皮膚を傷めたりすることがありますので注意して下さい。

① 器具の挿入時に痛みや違和感がある場合は、肛門部から挿入し、挿入部に痛みや違和感がないよう確認してから挿入して下さい。

② 器具の挿入時に痛みや違和感がある場合は、器具挿入部を真す方向に押し出し、先端周囲をぬらす挿入してください。

③ 薬液注入後、充分に便意が喚起されない場合は、器具を抜き、器具を洗い、器具をぬらす挿入してください。

【使用方法】



第2類医薬品

キャップ式

ミツ星 ダイヤ浣腸30

30g×5個入

発売元 **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**
奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい
(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります)
- (4)使用期限がすぎたものは使用しないで下さい

【使用方法】

- ① 容器のキャップを取り外し、挿入部に傷・バリ等がないかを確認して、肛門部へ挿入します
(滑らかに挿入できない場合は、容器挿入部を真上に向け薬剤を押し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります)
 - ② 容器を押しつぶしながらゆっくりと薬液を注入します
 - ③ 薬液注入後、充分便意が強まってから排便して下さい
- ※ 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意して下さい

副作用被害救済制度の間合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読み下さい
また、必要な時に認めるように大切に保管して下さい

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

連用しないで下さい
(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります)

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい)
 - (3) 高齢者
 - (4) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血
 - (5) 次の診断を受けた人
心臓病
2. 2~3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

その他の注意

次の症状があらわれることがあります
立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

【効能・効果】便秘

【用法・用量】

12歳以上 1回量(1個)を直腸内に注入し、それで効果の見られない場合にはさらに同量をもう一度注入する

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい
- (3) 12歳未満の小児には、使用させないで下さい
- (4) 洗腸にのみ使用して下さい

【成分・分量】

1個(30g中) 濃グリセリン 15g
(添加物としてベンザルコニウム塩化物含有)

使用期限

製造番号

【便秘しがちな方のために】

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。
2. 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。
(例:野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など)
3. 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけましょう。
4. 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。



4 976084 170686



* 1 3 0 1 8 0 4 *

2013年1月改訂第4版



第2類医薬品

キャップ式

三ツ星 ダイヤ浣腸30

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**
奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

30g×10個入



1301C04
2013年1月改訂第4版

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読み下さい
また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい

△ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと**
連用しないで下さい
(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)
薬剤にたよりがちになります)

■ **相談すること**
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に
相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(流産の
危険性があるので使用しないことが望ましい)
(3) 高齢者
(4) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気、嘔吐、痔出血
(5) 次の診断を受けた人
心臓病
2. 2~3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、
この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談して下さい

その他の注意

次の症状があらわれることがあります
立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感



使用期限
製造番号



第2類医薬品

キャップ式

三ツ星 ダイヤ浣腸30

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**
奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

30g×10個入

【効能・効果】 便秘
【用法・用量】 12歳以上 1回量(1個)を直腸内に注入し、それで効果の見られない場合
にはさらに同量をもう一度注入する

〈用法・用量に関する注意〉
(1) 用法・用量を厳守して下さい
(2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります)
(3) 12歳未満の小児には、使用させないで下さい
(4) 洗腸にのみ使用して下さい

【成分・分量】 1個(30g中)
濃グリセリン 15g(添加物としてベンザルコニウム塩化物含有)
【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります)
(4) 使用期限がすぎたものは使用しないで下さい

【使用方法】
① 容器のキャップを取り外し、挿入部に傷・バリ等がないか確かめて、肛門部へ挿入し
ます(滑らかに挿入できない場合は、容器挿入部を真上に向け薬剤を押し出し、先端
周囲をぬらすと挿入しやすくなります)
② 容器を押しつぶしながらゆっくりと薬液を注入します
③ 薬液注入後、充分便意が強まってから排便して下さい
※ 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意して下さい

【便秘しがちな方のために】
1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入る
よう心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。
2. 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。
(例:野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など)
3. 適度な運動、腹部マッサージなどは行うよう心がけましょう。
4. 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

