



* 0 8 1 2 A 0 3 *

2008年12月改訂 第3版

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください
また、必要な時に読めるように大切に保存してください

第2類医薬品

水虫、たむし用薬

三ツ星 ダイヤ軟膏

【製品の特長】

水虫は、白癬菌により起こるもので、かゆみ、痛みなどの症状を示すこともあります
ダイヤ軟膏は、白癬菌に対し殺菌作用及び発育阻止作用があり、痛み、かゆみを押え
水虫、ぜにたむし、いんきんたむしに効果を現わします

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の部位には使用しないでください
- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
 - (2) 湿疹
 - (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 乳幼児
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 患部が顔面又は広範囲の人
 - (6) 患部が化膿している人
 - (7) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い）

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】 水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回小量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください
- (2) 目に入らないように注意してください 万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください
- (4) 外用にのみ使用してください

【成分・分量】（本品100g中）

サリチル酸……20.0g

添加物としてアミノ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、流動パラフィン、白色ワセリンを含有します

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 幼小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります）

発売元 東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**
奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）