

# のどの痛み 口内炎

## アズショットのどスプレー

開封口

### 口腔内消炎剤

販売名：アズショット

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読みるように大切に保管してください。

#### △ 使用上の注意

##### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 口内のたれかひどい人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことのある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感 (1) 症状が悪化した場合。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】 1日数回少量を患部に噴射塗布してください。  
〈用法・用量に関する注意〉

(1) 定められた用法・用量を守ってください。

(2) 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2~3回噴射してください。

(3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。


(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。




外装フィルム：PP

#### 【使用方法】




①容器のフタをはずしてください。



②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2~3回直射してください。  
※最初は薬液が噴出するまで4~5回押してください。

※薬液がノズルの先端にたまつた時は、波打れを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。  
絶対におやめください。



\* 1 4 0 5 A 0 1 \*

2014年5月初版

水溶性アズレン 配合

# のどの痛み 口内炎

## アズショットのどスプレー



第3類医薬品



4 935583 204414

製造番号

使用期限

#### 【効能・効果】

のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

【容 量】 30mL

【成 分 分 量】 (本剤1mL中)

アズレンヌルホン酸ナトリウム  
(水溶性アズレン) ..... 0.2mg  
添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、ラベン、l-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

#### 【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(4) 薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落してください。(5) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出てこなくなることがあります。(6) 火気に近づけないでください。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元：白金製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日除く)

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931