

第2類医薬品



かさつく肌の かゆみに

タナール AI乳液

第2類医薬品



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく早くご使用ください。
- (5) 使用後はキャップをしっかりと閉めてください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

発売元
SHIROGANE 白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町 515
<http://www.sirogane.info/>

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元：ダイワ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町 515

紙箱 MADE IN JAPAN



* 1408B01 *
2014年8月初版

第2類医薬品

タナール AI乳液

販売名 タナール AI乳液 鎮痒消炎薬

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるようにこの紙箱を大切に保管してください。

特 徴

- かゆみ止め、抗炎症成分、保湿成分配合で皮膚炎やかさつく肌のかゆみストップ!
- のびがよく、お肌にスーッと馴染む乳液タイプです。
- このような時にお使い下さい。
 - ・ 乾燥による腕・脚のガサガサに
 - ・ 衣服によるかゆみに
 - ・ お風呂上がり、お休み前のかゆみに

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等 (2) 傷口、または赤くはれているところ (3) ただれやひび割れのひどいところ

⚠ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この紙箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5~6日使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この紙箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (6) 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目目で顔面には使用しないでください。

【成分・分量】 1g中

ジフェニヒドラミン塩酸塩・・・10mg
クロタミトン・・・50mg
リドカイン・・・20mg
グリチルレチン酸・・・2mg
トコフェロール酢酸エステル・・・5mg
添加物として、ステアリルアルコール、ステアリン酸、1,3-ブチレングリコール、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ヒアルロン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、エデト酸Na、pH調整剤、BHA、香料を含有する。

ステロイド成分を配合していません



4 976084 441762

タナール AI乳液 日邦

製造番号
使用期限

かさつく肌の
かゆみに

タナール AI乳液

鎮痒消炎薬

容量
100g