

下痢・くだり腹・軟便
食あたり・はき下し・水あたり

この注意書は服用前に必ずお読みください
また、必要時に読めるよう保管しておいてください

青ぐすり「錠剤」

製品の特徴

センブリ・ゲンノショウコ・クジン・ヨウバイヒ・オウゴン・塩化ベルベリン・ロートエキスなどの自然の生薬を主体にしたお薬です。

下痢・くだり腹・軟便などによく効きます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがある。)
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状がある人。・・・・・・排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。・・・・・・心臓病、緑内障
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
・・・・・・口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなることもある。

●【効能・効果】

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

●【用法・用量】

年 令	1 回服用量
1 5 歳以上	1 回 4 錠
8 歳以上15歳未満	1 回 2 錠
5 歳以上8 歳未満	1 回 1 錠

1 日 3 回食後水又は白湯にて服用する。

- (1)本剤は劇薬に該当する成分も含まれているので、定められた用法、用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3)5歳未満の乳幼児に服用させないこと。

●【錠剤の取り出し方】

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



●【成分・分量】 1日量(12錠)中

成 分	含 量	働 き
センブリ	300mg	苦味健胃剤として消化不良、食欲不振に応用する。 鎮静効果、抗炎症効果。 Lindou 科センブリの全草。
ゲンノショウコ	600mg	健胃・整腸薬。十二指腸や小腸のぜん動運動を抑制し、 整腸作用をする。 Furo 科のゲンノショウコの全草。
クジン	300mg	苦味健胃、解熱、利尿薬として用いる。 「神農本草経」の中品。 マメ科のクララの根。
ヨウバイヒ	300mg	収れん作用により下痢に用いられる。 ヤマモモ科のヤマモモの樹皮。
オウゴン	400mg	古くから黄だん、腹痛、下痢の要素として用いられる。 シソ科のコガネバナの根。
塩化ベルベリン	210mg	オウレンやオウバクの主成分。 止瀉、整腸、殺菌作用がある。
ロートエキス	30mg	胃酸過多、胃痛、胃けいれんなどに消化液分泌抑制剤として 用いる。ナス科のハシリドコロの根。

なお、添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、バレイショデンプン、ステアリン酸Mg、タルクを含む。

●保管および取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり、品質が落ちることがある。)

※ 本製品のお問い合わせは、配置員又は下記までお願いします。

【お問い合わせ先】 **太陽堂製薬株式会社** お客様相談係
〒635-0153 奈良県高市郡高取町下土佐 5 7 8
電 話 0744-52-2174 (受付時間 8:30～17:00 土・日祝を除く)