

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

鼻みず・鼻づまり・鼻炎に フレッシュ「タイヨー」 点鼻薬

◎鼻炎や鼻かぜにかかると、鼻みずがとまらなくなったり、鼻づまり、頭重などの不快な症状があらわれてきます。

フレッシュ「タイヨー」は、有効成分が霧状の微粒子となって鼻の奥まで均一に広がりますので、すばやく鼻づまりなどの不快さを解消します。

△使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 長期連用しないこと。

👤相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

3. 3日間位使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

◎【効 能】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)





◎【用法・用量】

年 齢	用法・用量
成人(15才以上)及び 7才以上の小児	1回に1～2度ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧する。 なお、適間隔は3時間以上おくこと
7才未満の小児	使用しないこと

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 過度に使用するとかえって鼻づまりを起こすことがある。用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 点鼻用にのみ使用すること。
- (4) 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療をうけること。

◎フレッシュ「タイヨー」の使い方

			
キャップをとります。	容器をもち液が噴霧するまで、数回パネの部分を押してください。	1～2回、鼻腔内に噴霧します。	使用後はノズル付近を清潔なティッシュペーパー等で拭き、キャップをしてください。

※初回使用する時は液が噴霧するまで数回押してください。

◎【成分・分量】(1mL中)

有 効 成 分	分 量	薬 理 作 用
ナファゾリン塩酸塩	0.5mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血をおさえ、鼻づまりなどに効果をあらわします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	3.0mg	抗ヒスタミン作用により、鼻みずの分泌過多を改善します。
ベンゼトニウム塩化物	0.2mg	鼻腔内を清潔にし、鼻づまりなどの緩和を助けます。

※添加物として安息香酸Na、pH調整剤を含有する。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 他の人と共用しないこと。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

発 売 元 日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田猪野 80-1

製造販売元 太陽堂製薬株式会社
奈良県高市郡高取町下土佐 578

お客様相談係 電話 0744-52-2174 (受付時間 8:30～17:00 土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

裏面もお読みください