

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# サヨンスーパー

## 第②類医薬品

### △ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起りやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 5歳未満の乳幼児。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。 (眠気等があらわれることがある。)

#### 4. 服用前後は飲酒しないこと

#### 5. 長期連用しないこと

### ■ 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状         | 関係部位  | 症 状     |
|-------|-------------|-------|---------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   | 精神神経系 | めまい     |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 | そ の 他 | 過度の体温低下 |

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称   | 症 状   |
|---|---|
| ショック<br>(アナフィラキシー)  | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。                                 |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(ステーキンス・ジョンソン症候群)<br>中毒性表皮壞死溶解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなったり皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 間質性肺炎   | 階段を上ったり、少し無理をすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。                             |
| 腎障害   | 発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。   |
| 肝機能障害   | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。   |
| ぜんそく  | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。   |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 眼気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し  
この文書を持って、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わること。)
- 1包を分割した残りを服用する場合には袋の折り口を折り返して保管し2日以内に服用すること。
- 配置期限経過後は服用しないこと。