

ご使用の際には、この説明文書をよくお読み下さい。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- 1) 医師の治療を受けている人。
- 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 4) 患部が広範囲の人。
- 5) 湿潤やただれのひどい人。
- 6) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください。

1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4) 本剤は使用期限内にご使用ください。
なお、期限を過ぎたものは使用しないでください。

効能・効果

湿疹、にきび、吹出物、きり傷、すり傷、
やけど、あせも、ただれ、くさ、とびひ、
虫さされ、じんましん、ひび、しもやけ、
あかぎれ、股ずれ、痔疾、外陰炎、肌荒れ、
ひげそりあと、アレルギー性皮膚炎

製造番号

使用期限



20g (700)

高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10
TEL 0744-54-2514

A6

20g

きり傷・すり傷・やけど

医薬品

アラントイン・ビタミンB₆配合
卵黄油配合基剤

ハイオロベリン®軟膏

20g

用法・用量

1日2～3回患部に適用する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

ジフェニヒドラミン…………… 1.00%
塩化ベンザルコニウム…………… 0.30%
アラントイン…………… 1.00%
塩酸ピリドキシン(ビタミンB₆)…………… 0.05%
添加物: 卵黄油、セタノール、ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、グリセリン脂肪酸エステル、香料、フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコール

しっとりなじんで
よくのびる

肌荒れ

ハイオロベリン®軟膏

医薬品

10g

すり傷

きり傷

〔成分・分量〕

塩化ベンザルコニウム0.30% ジフェンヒ
ドラミン1.00% アラントイン1.00% 塩
酸ピリドキシン(ビタミンB6) 0.05%

添加物: 卵黃油、セタノール、ワセリン、流動パラフィン、フ
ロピレングリコール、ステアリン酸ポリオキシエチレンソル
ビタン、グリセリン脂肪酸エステル、香料、フェニルエチル
アルコール、ベンジルアルコール

使用期限

製造番号



4 987402 130909

高市製薬株式会社 奈良県高市郡明日香村野口10

しっとりなじんで
よくのびる

しっしん

ハイオロベリン®軟膏

医薬品

10g

すり傷

きり傷

〔効能・効果〕

きり傷、すり傷、やけど、湿疹、にきび、吹出物、あ
せも、ただれ、くさ、とびひ、虫さされ、じんましん、
ひび、しもやけ、あかぎれ、股ずれ、痔疾、外陰炎、
肌荒れ、ひげそりあと、アレルギー性皮膚炎

〔用法・用量〕 1日2～3回患部に適用する。

〔注 意〕

1. 使用に際しては、説明書をよく読んでください。
2. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管
してください。
3. 小児の手の届かないところに保管してください。
4. 本剤は使用期限内に使用してください。なお、
期限を過ぎたものは使用しないでください。



鎮痒消炎薬

きり傷・すり傷・やけど
ハイオロベリン®軟膏
HI.OROBERIN Ointment

特徴

ハイオロベリン軟膏は、きり傷、すり傷などの創傷の炎症、いたみを和らげ破損した皮膚の回復を早めます。また、傷口よりの細菌の侵入を防ぎ、傷を早く治します。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 4) 患部が広範囲の人。
 - 5) 湿潤やただれのひどい人。
 - 6) 深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

湿疹、にきび、吹出物、きり傷、すり傷、やけど、あせも、ただれ、くさ、とびひ、虫さされ、じんましん、ひび、しもやけ、あかざれ、股ずれ、痔疾、外陰炎、肌荒れ、ひげそりあと、アレルギー性皮膚炎

用法・用量

1日2～3回患部に適用してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

成 分	含 量	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1.00%	患部のかゆみ・はれを鎮めます。
塩化ベンザルコニウム	0.30%	患部を殺菌・消毒します。
アラントイン	1.00%	あれた皮膚を修復します。
塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)	0.05%	皮膚の生理機能を改善します。

※ 添加物:卵黄油、セタノール、ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、グリセリン脂肪酸エステル、香料、フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコール

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - 2) 小児の手の届かないところに保管してください。
 - 3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - 4) 本剤の使用期限は外箱に記載してありますので、使用期限内にご使用ください。
- なお、期限を過ぎたものは使用しないでください。

お問い合わせ先

- 1) 本剤の購入先
- 2) 高市製薬株式会社 お客様相談室
TEL 0744-54-2514(土・日・祝祭日を除く 9:00～17:00)

高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10