

ご使用の際には、この説明文書をよくお読み下さい。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- 1) 医師の治療を受けている人。
- 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 4) 患部が広範囲の人。
- 5) 湿潤やただれのひどい人。
- 6) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください。

1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4) 本剤は使用期限内にご使用ください。
なお、期限を過ぎたものは使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

20g

効能・効果

きり傷、すり傷、やけど、湿疹、にきび、吹出物、あせも、ただれ、くさ、とびひ、虫さされ、じんましん、ひび、しもやけ、あかぎれ、股ずれ、痔疾、外陰炎、肌荒れ、ひげそりあと、アレルギー性皮膚炎

製造番号

使用期限



20g (700)

高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10

TEL 0744-54-2514

A7

きり傷・すり傷・しっしん

第3類医薬品

アラントイン・ビタミンB₆配合
卵黄油配合基剤

ハリオロベリン®軟膏

20g

用法・用量

1日2～3回患部に適用する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量 (100g中)

ジフェンヒドラミン…………… 1.00g
 ベンザルコニウム塩化物…………… 0.30g
 アラントイン…………… 1.00g
 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) …… 0.05g
 添加物:卵黄油、セタノール、ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、グリセリン脂肪酸エステル、香料、フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコール