

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ペラックスイート ライムS 24粒

第2類
医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6) 次の症状のある人：高熱
(7) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分・分量 12粒中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・・・・・・・・ 37.5mg
グアヤコールスルホン酸カリウム・・・・・・ 135.0mg
セチルピリジニウム塩化物水和物・・・・・・ 6.0mg
添加物：銅クロロフィリンNa、グリセリン脂肪酸エステル、還元パラチノース、
l-メントール、香料

用法・用量

成人(15歳以上) 及び 8歳以上	1回2粒	1日5～6回 口中に含み、かまずにゆっくり 溶かして服用して下さい。
5歳以上8歳未満	1回1粒	2時間以上の間隔をおいて服用して下さい。
5 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 用法・用量を厳守して下さい。(2) 5歳以上
の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

効能・効果

せき、たん、
ぜんそく、
のどの炎症に
よる声がれ・
のどのあれ・
のどの不快感・
のどの痛み・
のどのはれ

使用期限

製造番号

のどの痛み・せき
のどの炎症による声がれ
たんに効く

第2類医薬品

ペラックスイート®
ライムs



Nodora-Kun

24粒 甘さスッキリシュガーレス
カロリーと虫歯が気になる方に



Daiichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

- 保管及び取扱い上の注意
- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質
が変わります)
 - (4) スティックパック開封後は速やかに服用して下さい。
 - (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

製造販売元
高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

●お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
電話 03 (5205) 8331
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931



紙
A8
登録商標