

指定医薬部外品 **ヴィメディカル ドロップ**

この説明文書は、服用の際にはよくお読みください。

開
け
口

〈効能・効果〉口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

〈用法・用量〉大人(15歳以上)及び5歳以上の小児 1回2粒 1日3～6回 1粒ずつ2粒までを口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。2時間以上の間隔をおいて服用してください。なお、5歳未満の乳幼児は服用しないでください。

〔用法・用量に関連する注意〕(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2)かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

〈成分・分量〉大人1日量(12粒)中
セチルピリジニウム塩化物水和物…6mg
添加物：グリセリン脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNa、白糖、水アメ、*l*-メントール、香料、ベンジルアルコール

〈保管及び取扱い上の注意〉(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合。

お客様相談室：リブ・ラボラトリーズ株式会社

フリーダイヤル 0120-64-4688(受付時間/平日 午前10時～午後3時)