

この箱はお薬とともに保管し、ご使用に際してよくお読み下さい。

コフト®せき止め

お水がいらない **ドロップタイプ**

医薬品

ノンシュガー
ミント味

24錠入
8歳から
服用できます

特長

1. 水なしで服用できるドロップタイプのせき止め薬を携帯しやすいスティック包装に4個ずつ入れてありますので、外出先でのせき止めに最適です。
2. せきの原因である狭くなった気管支を拡張させる α_1 -塩酸メチルエフェドリン配合により、すぐに止めたいつらいせきによく効きます。
3. アレルギー性のせきを鎮める α_1 -マレイン酸クロルフェニラミン配合。
4. 成分は承認基準の1日最大量を配合しています。
5. ぜんそく性のせきやたんにもご使用いただけます。
6. ノンシュガー。1回2錠当たり6キロカロリー。
7. さわやかミント味。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ☒ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬 2.眠気があらわれることがありますので服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

相談すること ☒ 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。①医師の治療を受けている人 ②妊婦又は妊娠していると思われる人 ③授乳中の人 ④高齢者 ⑤本人又は家族がアレルギー体質の人 ⑥薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ⑦高熱、排尿困難の症状のある人 ⑧心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害の診断を受けた人 2.次の場合は直ちに服用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- ①服用後、発疹・発赤、かゆみ、悪心・嘔吐、食欲不振、めまい、排尿困難などの症状があらわれた場合。
- ②5～6回服用しても症状がよくなりません。
- 3.口のかわきがあらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

【効 能】 せき、ぜんそく、たん

【用法・用量】 次の量をかむか、口中で溶かして服用して下さい。8歳未満は服用しないこと。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	2錠	3回
8歳以上15歳未満	1錠	4時間以上の間隔をあけること

用法・用量に関連する注意 ①定められた用法・用量を厳守して下さい。②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。 ㊞登録商標

販売
高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10番地
製造販売元
日本臓器製薬株式会社
大阪府中央区平野町2丁目1番2号
お昼間相談窓口 ☎06-6222-0441
土・日・祝日を除く 9:00～17:00

製造番号:

アルミ袋未開封:
時の使用期限:

ミント味

ドロップタイプ

お水がいらない

コフト®せき止め

開け口



ミント味

コフト® せき止め

お水がいらない
ドロップタイプ

ノンシュガー

医薬品

携帯しやすい
スティック包装

24錠入
8歳から
服用できます

コフト®せき止め **ドロップタイプ** **ノンシュガー** **ミント味**

【保管及び取り扱い上の注意】 ①開封後の残りは袋の口を折り返して封をするように閉じ、なるべくお早めに服用して下さい。②直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。③小児の手の届かない所に保管して下さい。④他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わることがあります。⑤使用期限を過ぎた商品、使用前に開封された形跡のある商品には服用しないで下さい。

【成分・分量】 1回量(2錠中) α_1 -塩酸メチルエフェドリン25mg、 α_1 -マレイン酸クロルフェニラミン2mg、添削剤:還元(5チノース、グリセリン脂肪酸エステル、黄色1号、アセチルアミン、ステアリン酸、香料(エタノール、香料抽出精製物、 β -メントール、香料抽出精製物)を抽出精製物。

24錠入
医薬品