

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

生薬製剤

「モリ」ケンイセイチョウ薬

特 徴

「モリ」ケンイセイチョウ薬は、和漢生薬の本来の特質を充分生かした飲み方として、振り出し又は煎液として得たエキスをを用いるお薬です。本剤は、10種類の生薬のそれぞれの薬能を期待し配合されたお薬で食欲不振、むかつき、便秘などの胃と腸の症状にすぐれた効きめがあります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位（急性症状及び便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合

成分及び分量

本剤1日量（1包）中、下記生薬を含有しています。

ケイヒ（桂皮）…………… 3.5 g	シュクシャ（縮砂）…………… 1.0 g
ウイキョウ（茴香）…………… 1.0 g	チクセンニンジン（竹節人参）… 0.2 g
ショウキョウ（生姜）…………… 0.8 g	キシツ（枳実）…………… 1.0 g
チョウジ（丁子）…………… 0.1 g	チンピ（陳皮）…………… 1.0 g
ソウジュツ（蒼朮）…………… 0.5 g	アカメガシワ（赤芽柏）… 2.5 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷蔵所または冷蔵庫などに保管し、服用時に再加熱して服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

効能又は効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき）、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、整腸（便通を整える）、軟便、便秘

用法及び用量

成人（15歳以上）は1日量（1包）を、水約600mlをもって煮て約400mlになるまでトロ火で煮つめ、袋を取り去り、その液を食前または食間に3回に分けて服用してください。8歳以上15歳未満は1/2量を用いてください。（食間とは食後2～3時間を指します）

<用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 本剤は8歳未満の小児には服用させないでください。
- 煎じ液は必ず熱いうちにかすをこしてください。
- 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、5～6日分をまとめて煎じないでください。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話（06）6629-0062
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

発売元

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2