

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

生薬製剤

「モリ」カンゾウ湯

特 徴

「モリ」カンゾウ湯は、和漢生薬の本来の特質を充分生かした飲み方として、振り出し又は煎液として得たエキスを用いるお薬です。本剤は、13種類の生薬のそれぞれの薬能を期待し配合されたお薬で、比較的丈夫な体质で体力のある人に適し、黄疸、肝臓疾患に伴う食欲不振、むかつき、嘔吐、腹満、便秘などによく効きます。



使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
 - 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

- 次的人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く、下痢しやすい人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 脳	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- 1カ月位（便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

効能又は効果

肝臓、黄疸、肝臓疾患による食欲不振、恶心、嘔吐、腹満、便秘

用法及び用量

朝1袋を熱湯200mL（約1合）で充分振り出して食前に服用してください。尚、残りの袋は300mL（約1合5勺）の水を加え約半量に煎じ詰めて就寝前に服用してください。小児は成人（15歳以上）の半量を服用してください。症状の重い場合は1袋を朝に振り出して用い、更に晩及び就寝前、新たに1袋を振り出して服用してください。

<用法及び用量に関する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 本剤は8歳未満の小児には服用させないでください。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、5～6日分をまとめて煎じないでください。

成分及び分量

本剤1袋（27g）中、下記生薬を含有しています。

ハンゲ（半夏）	4.0 g	タイソウ（大棗）	3.0 g
ショウキョウ（生姜）	4.0 g	キジツ（枳実）	2.0 g
シャクヤク（芍薬）	3.0 g	ピンロウジ（檳榔子）	0.2 g
ダイオウ（大黃）	1.0 g	サンシシ（山梔子）	0.2 g
カンゾウ（甘草）	0.2 g	ドベッコウ（土別甲）	0.2 g
サイコ（柴胡）	6.0 g	インチンコウ（茵陳蒿）	0.2 g
オウゴン（黃芩）	3.0 g		

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）
- 朝振り出した袋は、夜煎じるまでの間、冷蔵庫に保管してください。

- 本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じことがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

電話（06）6629-0062

受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

発売元

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2