

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

生薬製剤

「モリ」シンゾウ湯

特 徴

「モリ」シンゾウ湯は、和漢生薬の本来の特質を充分生かした飲み方として、振り出し又は煎液として得たエキスを用いるお薬です。本剤は、12種類の生薬のそれぞれの薬能を期待し配合されたお薬で、心臓疾患に伴うどうき、息切れなどにすぐれた効きめがあります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 高齢者。
- (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
むくみ
- (8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- (9) 次の医薬品を服用している人。
瀉下薬 (下痢)

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧 が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

効能又は効果

心臓疾患及び心臓衰弱の動悸、息切れ、むくみ、めまい、手足の冷え、血色不良

用法及び用量

朝1袋を熱湯200mL (約1合) で充分振り出して食前に服用してください。尚、残りの袋は300mL (約1合5勺) の水を加え約半量に煎じ詰めて就寝前に服用してください。小児は成人 (15歳以上) の半量を服用してください。症状の重い場合は1袋を朝に振り出して用い、更に晩及び就寝前、新たに1袋を振り出して服用してください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 本剤は8歳未満の小児には服用させないでください。
- (3) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- (4) 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、5～6日分をまとめて煎じないでください。

成分及び分量

本剤1袋 (12.7g) 中に、下記生薬を含有しています。

ブクリョウ (茯苓) …… 6.0g	ショウキョウ (生姜) …… 0.2g
キョウニン (杏仁) …… 4.0g	ダイオウ (大黄) …… 0.2g
カンゾウ (甘草) …… 1.0g	タイソウ (大棗) …… 0.2g
ボレイ (牡蛎) …… 0.3g	ハンゲ (半夏) …… 0.2g
オウゴン (黄芩) …… 0.2g	ケイヒ (桂皮) …… 0.1g
サイコ (柴胡) …… 0.2g	ゴシュユ (呉茱萸) …… 0.1g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4) 朝振り出した袋は、夜煎じるまでの間、冷蔵庫に保管してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話 (06) 6629-0062
受付時間 10時から17時まで (土、日、祝日を除く)

製造販売元

高砂製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

発売元

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2