



日本薬局方 カンゾウ末

販売名：高砂カンゾウ末

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

- ☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
- ・短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 次の症状のある人——むくみ。
 - (5) 次の診断を受けた人——高血圧・心臓病・腎臓病。

- 服用後は、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この記載文面を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	偽アルドステロン症、ミオパチー
症 状	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この記載文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】 激しい咳、咽喉痛の緩解

【用法及び用量】 成人(15歳以上)は 1回量 0.5g、1日2回、食前または食間に服用する。

原 1472

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

版記号0811

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
 3. 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
 4. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
 5. 開封後はお早めにご使用ください。また、開封口をしっかりと閉じて保管してください。
- ◎万一製品に異常がありましたら 弊社宛御連絡ください。

原 2