



日本薬局方
センプリ末
販売名：高砂センプリ末

第3類医薬品

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
▪ 医師の治療を受けている人。
- 5～6日服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この記載文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

服用目的	【効能又は効果】	【用法及び用量】	
		成人(15歳以上)	15歳未満
健胃	胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき	1回量 0.015 g、 1日3回、食前または食間に服用する。	服用しないこと
止瀉	下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便	1回量 0.3 g、 1日3回を限度として服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。	

原記号1406

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

原記号0811

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 開封後はお早めにご使用ください。また、開封口をしっかりと閉じて保管してください。

◎万一製品に異常がありましたら
弊社宛御連絡ください。

H22