

日本薬局方

第2類医薬品

ダイオウ末

販売名：高砂ダイオウ末

使用上の注意

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を使用している間は、次の医薬品は使用しないでください。
 - ・他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

【相談すること】

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
 - ・はげしい腹痛、悪心・嘔吐

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

(2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

・下痢

【効能又は効果】

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法及び用量】

成人(15歳以上)は1日1回、0.75g～1.5gをなるべく就寝前に服用する。ただし、初回は最小量を用い便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する。

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

お客様相談窓口

☎072-977-7151

5000000000000


第2類医薬品

500g

日本薬局方

ダイオウ末

高砂ダイオウ末



ロット番号 XXXXXX

4 9 8 7 5 7 4 1 4 0 1 1 9

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
4. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
5. 開封後はお早めにご使用ください。また、開封口をしっかりと閉じて保管してください。

○ 万一製品に異常がありましたら
弊社宛御連絡ください。



紙：外箱
ラベル



：内袋

