



日本薬局方

ダイオウ末

第2類医薬品

販売名:高砂ダイオウ末

※ 別面の『使用上の注意』をよく読んで、正しく御使いください。

【効能 又は 効果】

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法 及び 用量】

成人（15歳以上）は1日1回0.75～1.5gをなるべく就寝前に服用する。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する。

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931（フリーダイヤル）

H23

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
4. 本品は、気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封後は次の点にご注意ください。
・なるべくお早めに御使用ください。
・確実に封止して保管してください。（吸湿防止・虫や異物の混入防止）

◎尚、本品に異常がありましたら弊社まで御連絡ください。

H25

⚠ 使用上の注意

❌【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品は使用しないでください。
・他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 【用法及び用量】に示す量よりも過剰に服用しないでください。



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（4）次の症状のある人 —— はげしい腹痛、吐き気・嘔吐。
（5）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
（6）胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 —— 下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

高砂ダイオウ末 H25