

医薬品

高砂ヨクイニン

日本薬局方 **ヨクイニン**

使用上の注意

【相談すること】

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感、下痢

【効能又は効果】

いぼ、皮ふのあれ

【用法及び用量】

成人（15歳以上）は1日量30gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓（カス）をこして取り去り、食前又は食間3回に分服する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (5)本品は、窒素封入包装により保存性を高めてあります。開封後はお早めにご使用ください。また、開封口をしっかりと閉じて保管してください。

高砂薬業(株)

大阪市阿倍野区
天王寺町南1-1-2

お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151
（9～17時 土・日・祝日を除く）

副作用救済制度

 0120-149-931

第3類医薬品



