

鎮痛・消炎冷感パップ剤

クールメルパスa 第3類医薬品

(6枚入×4袋)

24枚入

【特長】

- 粘着力が強く、皮膚にピッタリ良くつきます。
- 高含水率の基剤を使用し、湿布効果に優れています。
- 皮膚にやさしい弱酸性です。
- 伸縮性タイプの不織布で関節部位の貼付にも便利です。

⚠【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】
次の部位には使用しないで下さい。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この
文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ、筋肉疲労、骨折痛

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

お問い合わせ先：株式会社タカミツ
フリーダイヤル 0120-459533 / 受付時間 (月～金曜日 9:00～17:00 祝日を除く)

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

【用法・用量】

表面のフィルムをはがして、1日1～2回患部に貼付して下さい。
必要な時は、包帯又はテープでとめて下さい。

【用法・用量に関する注意】

1. 定められた用法・用量を守って下さい。
2. 体の表面に脂や汗がある場合は、よく拭き取ってから貼付して下さい。
3. 本剤に触れた手で、目、鼻腔、唇等の粘膜に触れないよう注意して下さい。
4. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。

【成分・分量】〈膏体 100g (1000cm²)中〉

サリチル酸メチル 1.0 g
dL-カンフル 0.4 g
L-メントール 0.3 g
トコフェロール酢酸エステル 0.2 g

添加物：エデト酸Na水和物、カオリン、酸化チタン、CMC-Na、ジヒドロキシアルミ
ニウムアミノアセテート、D-ソルビトール、グリセリン、酒石酸、ポリソルベート80、
ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、ヒ
マシ油、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 使用後は、未使用分を袋に戻し、外気に触れないよう開封口のチャック
をきちんと閉めて保管して下さい。
3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
4. 他の容器に入れ替えないで下さい。
[誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。]
5. 使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
6. 開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用下さい。

【包装】24枚入 (6枚入×4袋 / 1枚：10cm×14cm)

製造販売元 株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市中区上飯田東町4の68の1



製造番号

使用期限



開
け
口