

サラボン液

成 分

アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩 10W/V%

ポリオキシエチレンアルキルフェニールエーテル 3 W/V%

製造元 竹本油脂株式会社

愛知県蒲郡市港町2番5号
電話 0533-68-2113

* 効 能 又 は 効 果 *

手指の消毒、食器、食品工場の設備器具類の消毒。

* 用 法 ・ 用 量 *

本品は家庭衛生、公衆衛生、産業衛生における各種の場合の殺菌消毒剤として下記の濃度に水で希釈してご使用下さい。

分 野	用 途	薄 め 方 (使用濃度) 使用 方法
公衆衛生分野 (家庭衛生分野)	手 指	1ℓ に2mℓ (500倍) 液で手を洗った後水洗する
	食器、調理器具類	1ℓ に1mℓ (1000倍) 液に5分以上浸した後充分水洗いする
	理髪店、美容院等の器具	1ℓ に5mℓ (200倍) 液に5分以上浸した後水洗する
	塵埃箱、冷蔵庫	1ℓ に5mℓ (200倍) 液にて噴霧又は拭拭する
産業衛生分野	食品工場の設備器具類	1ℓ に1mℓ (1000倍) 液に5分以上浸漬 又は噴霧した後充分水洗する

[注] 食器、調理器具等は予め、汚れを非イオン型洗剤 (例えばラボンS) などで除き、
そのまゝ又は軽く水洗した後、上記の使用法に準拠し、殺菌消毒を行って下さい。

* サラボン液使用上の注意 *

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 今までに薬や医薬品等によるアレルギー症状 (例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等) を起こしたことがある人。
- (2) 患部が広範囲の人。
- (3) 深い傷やひどいやけどの人。
- (4) 医師の治療をうけている人。

2. 使用に際して、次のことに注意すること

- (1) 定められた用法、用量を守ること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 眼に入らないように注意すること。原液を扱う場合は保護眼鏡を着用して下さい。万一眼に入った場合には、こすらずすぐに流水で15分以上洗うこと。尚、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けること。
- (4) 本剤は外用のみに使用し、内服しないこと。
- (5) 本品は糞便、吐物、下水、飲料水の消毒には不適である。
- (6) 特異体質の方はゴム手袋を着用して下さい。

3. 使用中又は使用後は、次のことに注意すること

本剤の使用により、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

4. その他

- (1) 食品には、触れないようにして下さい。食品製造、加工用の機器・容器等は消毒後泡がなくなるまで充分水洗いして下さい。
- (2) 石ケン等のアニオン活性剤とは、不溶性の沈澱を生じ効力が低下しますので、併用しないで下さい。

5. 保管及び取扱上の注意

- (1) 小児のシャボン玉遊びやいたずらに注意し、小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく、涼しい場所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

6. 次の医薬品とは沈澱を生じたり効力の低下があるので配合は出来ない。

硝酸銀、プロティン銀、塩化第二水銀、過マンガン酸カリウム、タンニン酸、スルホサリチル酸、スルホサリチル酸ナトリウム、重クロム酸カリウム、ヨードチンキ、マーキュロクロム、フェノール

* サラボン液の作用 *

本剤は使用濃度において緑膿菌、結核菌、一般細菌等には有効であるが、肝炎ウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

NET17KG

LOT NO.

効能 又は 効果

手指・皮膚の殺菌洗浄、各種食品工場における、機械器具、調理器具、工場内の床等の殺菌洗浄、又病院内の衛生管理維持にご利用ください。

用法 用量

用 途	使用濃度	使 用 方 法
手指 伝染病予防の目的で帰宅後、炊事前、食事前、用便後	1Lに4mL (250倍)	液に浸したのち強くもみ洗いしたのち、水洗いする。
調理器具	1Lに3mL (330倍)	液に5分間浸したのち、充分に水洗いする。
床・畳・浴槽・手洗い場の消毒・清拭	1Lに3mL (330倍)	清拭する。
病院・理髪店・美容院・電車・バス・船舶・航空鬼頭の消毒・清拭	1Lに4mL (250倍)	清拭する。

サ ラ ボ ン L 液 の 作 用

本剤は使用濃度において緑膿菌、結核菌、一般細菌、真菌等には有効であるが、肝炎ウイルスに対する殺菌効果は期待できない。