

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

庄 蓉 湯

(生薬製剤)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、下痢
 - (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

肋間神経痛

用法・用量

本品1袋を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水550mL（約3合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人	1日分の1／3量	3 回
7～15歳	成人の1／2量	
4～6歳	成人の1／3量	
2～3歳	成人の1／6量	
2歳未満	成人の1／10量	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 服用に際しては人肌程度に温めて服用してください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本品1袋（28.5g）中、下記生薬を含有します。

シャクヤク…3.0g	シュクシャ …3.0g	トウキ …3.0g
サイコ …3.0g	モッコウ …3.0g	セイヒ …3.0g
センキュウ…3.0g	ショウキョウ…0.5g	コウブシ …3.0g
キシツ …3.0g	カンゾウ …0.5g	リュウタン…0.5g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 煎じた薬液は冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7