

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

伶 鳴

(生薬製剤)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・食欲不振、胃部不快感、はげしい 腹痛を伴う下痢、腹痛

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

軟便、下痢

効能・効果

耳鳴り

用法・用量

本品1袋を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水550mL（約3合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこばれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ成人1日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人	1日分の1／3量	3 回
7 ～ 15 歳	成人の1／2量	
4 ～ 6 歳	成人の1／3量	
4 歳 未 満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- （2）服用に際しては人肌程度に温めて服用してください。
- （3）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品1袋（8.0g）中、下記生薬を含有します。

オ ウ バ ク	-----	0.5g	ダ イ オ ウ	-----	0.5g
カ ン ソ ウ	-----	0.5g	ト ウ キ	-----	0.5g
セ ン キ ユ ウ	-----	0.5g	ジ オ ウ	-----	0.5g
オ ウ ゴ ン	-----	0.5g	サ ン シ シ	-----	0.5g
コ ウ ブ シ	-----	0.5g	サ イ コ	-----	0.5g
キ ジ ツ	-----	0.5g	チ モ	-----	0.5g
モ ッ コ ウ	-----	0.5g	ボ ウ フ ウ	-----	0.5g
セ イ ヒ	-----	0.5g	レ ン ギ ヨ ウ	-----	0.5g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手のとどかない所に保管してください。
- （3）煎じた薬液は冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7