

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

しょう かく とう  
**松 鶴 湯 A**  
（漢方製剤）



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
**次の人は服用しないこと**  
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
（1）医師の治療を受けている人。  
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。  
（3）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：  
貧血、不眠症、精神不安、神経症

用法・用量

本品 1 包を煎じる容器(鉄製のものは使用しない)に入れ、水 550mL(約 3 合)を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人 1 日量とし食間に服用します。

| 年 齢       | 1 回 量    | 1日服用回数 | 食間とは… —<br>食後2～3時間を<br>指します。 |
|-----------|----------|--------|------------------------------|
| 成 人       | 1日分の1/3量 | 3 回    |                              |
| 7歳以上15歳未満 | 成人の2/3量  |        |                              |
| 4歳以上 7歳未満 | 成人の1/2量  |        |                              |
| 2歳以上 4歳未満 | 成人の1/3量  |        |                              |
| 2 歳 未 満   | 成人の1/4量  |        |                              |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品 1 包 (26.8g) 中、下記生薬を含有します。

|                           |      |                       |      |
|---------------------------|------|-----------------------|------|
| ニ    シ    ン               | 2.4g | ビ   ャ   ク   ジ   ュ   ツ | 2.4g |
| ブ   ク   リ   ョ   ウ         | 2.4g | サ   ン   ソ   ウ   ニ   ン | 2.4g |
| リ   ュ   ウ   ガ   ン   ニ   ク | 2.4g | オ   ウ   ギ             | 2.4g |
| ト   ウ   キ                 | 1.6g | オ   ン   ジ             | 1.6g |
| サ   イ   コ                 | 2.4g | サ   ン   シ   シ         | 1.6g |
| カ   ン   ソ   ウ             | 0.8g | モ   ッ   コ   ウ         | 0.8g |
| タ   イ   ソ   ウ             | 1.6g | シ   ョ   ウ   キ   ョ   ウ | 0.4g |
| ポ   タ   ン   ピ             | 1.6g |                       |      |

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。
- (2) 本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂      お客様相談室  
電    話    03-3843-3833  
受付時間   9時から17時まで(土、日、祭日を除く)