

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

恵 賜（エキス顆粒）

（漢方薬）



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）
次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - （1）医師の治療を受けている人
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人
 - （3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - （4）今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

（1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振

（2）1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

＊効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：にきび、しみ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、月経不順、血の道症注）

注）血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

用法・用量

毎食間に水又はお湯にて服用

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人	1 包(2.2g)	3 回
7 歳以上15歳未満	成人の2/3量	
4 歳以上7 歳未満	成人の1/2量	
2 歳以上4 歳未満	成人の1/3量	
2 歳未満	成人の1/4量	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本品3包（1包2.2g）中、下記生薬より製した水製エキス（乾燥エキスとして）1.5gを含有します。

ケ イ ヒ -----	2.0g	ト ウ ニ ソ -----	2.0g
ブ ク リ ョ ウ -----	2.0g	シ ャ ク ヤ ク -----	2.0g
ポ タ ソ ピ -----	2.0g	ヨ ク イ ニ ソ -----	5.0g

添加物として乳糖を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1 包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7