

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

腫 経（エキス顆粒）

（漢方薬）



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - （1）医師の治療を受けている人
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人
 - （3）胃腸が弱く下痢しやすい人
 - （4）高齢者
 - （5）次の症状のある人
むくみ
 - （6）次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

（1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

	症状の名称	症 状
*	間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、 発熱等があらわれる
	偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、血 圧が高くなる、頭痛等があらわれる

（2）1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

効能・効果

体力中等度のものの次の諸症：頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
7 ～ 14 歳	2 / 3 包	
4 ～ 6 歳	1 / 2 包	
2 ～ 3 歳	1 / 3 包	
2 歳 未 満	1 / 4 包以下	

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- （3）1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本品3包（1包2.2g）中、下記生薬より製した水製エキス（乾燥エキスとして）1.6gを含有します。

ブクリョウ	-----	2.5g	ト ウ キ	-----	1.5g
オ ウ ゴ ン	-----	1.5g	カ ン ソ ウ	-----	1.5g
シャクヤク	-----	1.0g	サ ン シ シ	-----	1.0g
ジ オ ウ	-----	1.5g	タ ク シ ャ	-----	1.5g
モ ク ツ ウ	-----	1.5g	シャゼンシ	-----	1.5g
カ ッ セ キ	-----	1.5g			

添加物として乳糖を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手のとどかない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- （5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7