

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

しゅ  
腫

けい  
経（エキス顆粒）

（漢方製剤）



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

#### 次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）胃腸が弱く下痢しやすい人。
- （4）高齢者。
- （5）次の症状のある人。 むくみ
- （6）次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称           | 症 状                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

#### 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度のものの次の諸症：頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用

| 年 齢        | 1 回 量      | 1 日服用回数 |
|------------|------------|---------|
| 成 人        | 1 包 (2.2g) | 3 回     |
| 7歳以上 15歳未満 | 成人の2/3量    |         |
| 4歳以上 7歳未満  | 成人の1/2量    |         |
| 2歳以上 4歳未満  | 成人の1/3量    |         |
| 2歳未満       | 成人の1/4量以下  |         |

食間とは… —  
食後2～3時間を  
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品3包（1包2.2g）中、下記生薬より製した水製エキス（乾燥エキスとして）1.6gを含有します。

|           |      |           |      |
|-----------|------|-----------|------|
| ブ ク リ ョ ウ | 2.5g | ト ウ キ     | 1.5g |
| オ ウ ゴ ン   | 1.5g | カ ン ソ ウ   | 1.5g |
| シ ャ ク ヤ ク | 1.0g | サ ン シ シ   | 1.0g |
| ジ オ ウ     | 1.5g | タ ク シ ャ   | 1.5g |
| モ ク ツ ウ   | 1.5g | シ ャ ゼ ン シ | 1.5g |
| カ ッ セ キ   | 1.5g |           |      |

添加物として乳糖水和物を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂      お客様相談室  
電 話    03-3843-3833  
受付時間   9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元    たてばやししょうかくどう  
株式会社 **建林松鶴堂**  
〒335-0024    埼玉県戸田市戸田公園3-7