

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

しょう かく てん よ
松 鶴 天 与（エキス顆粒）
（漢方製剤）

 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）胃腸の弱い人。
 - （4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度で、せきが続き、たんが多くて切れにくいものの次の諸症：たんの多く出るせき、気管支炎

用法・用量

食前又は食間の空腹時に水又はお湯にて服用。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人	1 包 (2.0g)	3 回
7歳以上15歳未満	成人の2/3量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/2量	
2歳以上 4歳未満	成人の1/3量	
2 歳 未 満	成人の1/4量	

食間とは… —
食後2～3時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品3包(6.0g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)3.6gを含有します。

オ ウ ゴ ン	1.75g	キ キ ヨ ウ	1.75g
ソ ウ ハ ク ヒ	1.75g	キ ヨ ウ ニ ン	1.75g
サ ン シ シ	1.75g	テ ン モ ン ド ウ	1.75g
バ イ モ	1.75g	チ ン ピ	1.75g
タ イ ソ ウ	1.75g	チ ク シ ヨ	1.75g
ブ ク リ ヨ ウ	2.1g	ト ウ キ	2.1g
バ ク モ ン ド ウ	2.1g	ゴ ミ シ	0.7g
シ ヨ ウ キ ヨ ウ	0.2g	カ ン ソ ウ	0.7g

添加物として乳糖を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03－3843－3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)