

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

意 発 (エキス顆粒)

(漢 方 薬)



使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
 3. 次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人 むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- (2) 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなりません

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。(下痢)

* 効能・効果

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

用法・用量

食間にも水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人	1 包(2.2g)	3 回
7 歳以上15 歳未満	成人の2/3量	
4 歳以上7 歳未満	成人の1/2量	
2 歳以上4 歳未満	成人の1/3量	
2 歳未満	成人の1/4量	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本品3包(1包2.2g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)1.5gを含有します。

ト ウ キ	----- 0.6g	シャクヤク	----- 0.6g
サン シ シ	----- 0.6g	レンギョウ	----- 0.6g
ショウキョウ	----- 0.2g	ハ ッ カ	----- 0.6g
ケ イ ガ イ	----- 0.6g	ハマボウフウ	----- 0.6g
マ オ ウ	----- 0.6g	センキュウ	----- 0.6g
ダイ オ ウ	----- 0.75g	硫酸ナトリウム	----- 0.75g
ビャクジュツ	----- 1.0g	キ キ ヨ ウ	----- 1.0g
オ ウ ゴ ン	----- 1.0g	カ ン ゾ ウ	----- 1.0g
セ ッ コ ウ	----- 1.0g	カ ッ セ キ	----- 1.5g

添加物として乳糖を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7