

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

松鶴堂・壮 胃（エキス顆粒）

（生薬製剤）



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）
次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - （1）医師の治療を受けている人
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人
 - （3）今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - （1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

- （2）1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

多くは腹痛を伴う胃炎、胃酸過多

用法・用量

毎食間に水又はお湯にて服用

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人	1 包(20g)	3 回
7歳以上15歳未満	成人の2/3量	
4歳以上7歳未満	成人の1/2量	
2歳以上4歳未満	成人の1/3量	
2歳未満	成人の1/4量以下	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本品3包（1包 2.0g）中、下記生薬より製した水製エキス（乾燥エキスとして）1.4gを含有します。

サ イ コ	----- 2.5g	ハ ン ゲ	----- 2.0g
オ ウ ゴ ン	----- 1.25g	チクセツニンジン	----- 1.25g
シャクヤク	----- 1.25g	ケ イ ヒ	----- 1.25g
タ イ ソ ウ	----- 1.25g	ショウキョウ	----- 0.25g
カ ン ゾ ウ	----- 0.75g	ボ レ イ 末	----- 1.5g
ウ イ キ ョ ウ	----- 0.75g		

添加物として乳糖及びバレイショデンプンを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7

0909DA