

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

不 癢 湯

(生薬製剤)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、血 圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

陰部湿疹

用法・用量

本品 1 袋を煎じる容器(鉄製のものは使用しない)に入れ、水550mL(約3合)を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこばれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ成人 1 日量とし食間空腹時に服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人	1 日分の 1／3 量	3 回
7 ～ 15 歳	成人の 1／2 量	
4 ～ 6 歳	成人の 1／3 量	
2 ～ 3 歳	成人の 1／6 量	
2 歳 未 満	成人の 1／10 量	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の間という意味で、食後 2 時間後位をいいます。
- (2) 服用に際しては人肌程度に温めて服用してください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本品 1 袋 (1 袋36g) 中、下記生薬を含有します。

キ キ ヨ ウ -----	2.0g	ハ ン ゲ -----	2.0g
ケ イ ヒ -----	2.0g	カ ン ソ ウ -----	2.0g
ショウキョウ -----	0.5g	カ ッ コ ン -----	3.0g
シャクヤク -----	3.0g	シ ヨ ウ マ -----	3.0g
ブクリョウ -----	3.0g	タイ ソ ウ -----	0.5g
ビャクジュツ -----	3.0g	カ ッ コ ウ -----	3.0g
ビ ャ ク シ -----	3.0g	ゲ ン ジ ン -----	3.0g
アカメガシワ -----	3.0g		

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 煎じた薬液は冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 0 3 - 3 8 4 3 - 3 8 3 3
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元
株式会社 建林松鶴堂
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7