

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

豊 心

(生薬製剤)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感、下痢

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

歯齦炎、口内炎、食欲不振

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人	1 包	3 回
7 ～ 15 歳	1／2包	
4 ～ 6 歳	1／3包	
2 ～ 3 歳	1／6包	
2 歳 未 満	1／10包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本品3包（1包2.0g）中、下記生薬を含有します。

キ キ ヨ ウ 末	0.4g	シ ャ ク ヤ ク 末	0.4g
セ ン キ ユ ウ 末	0.4g	ブ ク リ ヨ ウ 末	0.4g
ト ウ キ 末	0.4g	タ ク シ ャ 末	0.4g
ビ ャ ク ジ ャ ッ 末	0.4g	シ ヨ ウ キ ヨ ウ 末	0.2g
カ ン ゾ ウ 末	0.2g	ニ ン ジ ン 末	0.4g
ジ オ ウ 末	0.4g	ト ウ ニ ン 末	0.4g
ボ ウ フ ウ 末	0.4g	タ イ ソ ウ 末	0.4g
シ ヨ ウ マ 末	0.4g	ボ ウ イ 末	0.4g

添加物としてステアリン酸マグネシウムを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 建林松鶴堂

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7