

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

扁 鵒

(生薬製剤)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (6) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
軟便、下痢

効能・効果

脂肪過多症

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人	1 包	3 回
7～15歳	1/2包	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品3包（1包2.0g）中、下記生薬を含有します。

タ ク シ ャ 末	-----0.86g	ダ イ オ ウ 末	-----0.43g
シ ョ ウ キ ヨ ウ 末	-----0.43g	カ ン ソ ウ 末	-----0.43g
ケ イ ヒ 末	-----0.43g	シ ャ ク ヤ ク 末	-----0.43g
ボ タ ン ピ 末	-----0.43g	チ ョ レ イ 末	-----0.86g
サ イ コ 末	-----0.86g	ハ ン ゲ 末	-----0.43g
シ ョ ウ マ 末	-----0.43g		

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7