

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

扁 鵲

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の医薬品を服用している人

瀉下薬（下剤）

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

(2) 1 カ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

軟便、下痢

効能・効果

脂肪過多症

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年齢	1 回量	1日の服用回数
成人	1 包	3 回
7～15歳	1 / 2 包	
7 歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品3包（1包2.0g）中、下記生薬を含有します。

タクシャ末……………0.86g	ダイオウ末……………0.43g	ショウキョウ末……………0.43g
カンゾウ末……………0.43g	ケイヒ末……………0.43g	シャクヤク末……………0.43g
ボタンピ末……………0.43g	チョレイ末……………0.86g	サイコ末……………0.86g
ハンゲ末……………0.43g	ショウマ末……………0.43g	

添加物は含有していません。

<成分・分量に関連する注意>

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

株式会社 ウチダ和漢薬 フリーダイヤル 0120-384638

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

発売元 株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町4-2-8

製造販売元 株式会社 建林松鶴堂

埼玉県戸田市戸田公園3-7