

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

平 鵲
へん せき

特徴 11種類の生薬が脂肪過多症に効く。

⚠【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (6) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、便秘、吐き気・嘔吐
そ の 他	むくみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

脂肪過多症

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人(16歳以上)	1 包	3 回
7～15 歳	1/2 包	
7歳未満	服用しないでください	

食間とは食事と食事の間という意味で、食後2~3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬を含有します。

タクシャ末…0.86g ダイオウ末…0.43g ショウキョウ末…0.43g
カンゾウ末…0.43g ケイヒ末…0.43g シャクヤク末…0.43g
ボタンピ末…0.43g チョレイ末…0.86g サイコ末…0.86g
ハンゲ末…0.43g ショウマ末…0.43g

添加物は含有していません。



タクシャ(沢瀉) ダイオウ(大黃) ショウキョウ(生薑) カンゾウ(甘草) ケイヒ(桂皮) シャクヤク(芍薬)



ボタンピ(牡丹皮) チョレイ(猪苓) サイコ(柴胡) ハンゲ(半夏) ショウマ(升麻)

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

包装

1包(2g)×21包、1包(2g)×60包

お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号：03-3293-4509 受付時間：9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

ホームページ：<http://www.taiho.co.jp/>

販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元

株式会社 建林松鶴堂
埼玉県戸田市戸田公園3-7