

第2類医薬品

殺菌消毒薬

マッキンZ

特納用

第2類医薬品

殺菌消毒薬

マッキンZ

色のつかないスプレータイプ

外用専用

40mL

特納用

押してあける

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起したことがある人
(4) 患部が広範囲の人
(5) 深い傷やひどいやけどの人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用后、次の症状が皮ふにあらわれた場合
発疹・発赤、かゆみ、はれ
(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

使用
期限

製造
番号



製造販売元
タマカワ
玉川衛材株式会社
東京都千代田区春本町2-16
TEL. 03-3861-2037

【効能・効果】

きり傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

【用法・用量】

1 日数回、適量を患部に塗布するか、又は本液を浸したガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆ってください。

用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

【成分】(本品40mL中)

ベンザルコニウム塩化物……………40mg
塩酸リドカイン……………400mg
ナファゾリン塩酸塩……………40mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩…80mg
添加物：香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。(使用期限は箱裏面・ボトル底面に記載)

効果的な使い方



スプレー式

口を上にしてボディを瞬間的に強く押すと薬が霧状にでます。



洗浄式

口を下にしてボディを軽く押すと、そのまま薬液が流れます。汚れた傷口の洗浄などに。



脱脂綿に浸して

洗浄式の要領で、脱脂綿又はガーゼに浸して用います。

玉川衛材(株)お客様相談窓口
TEL. 03-3861-2037
受付時間 平日9:00~17:00(土日・夜を除く)

副作用被害救済制度
TEL. 0120-149-931