



殺菌消毒薬 外用/80mL

第2類医薬品

効能
効果

きり傷、すり傷、さし傷、かき傷
靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布するか、又は
本液を浸したガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆う。

成分：本品 80mL中 ベンザルコニウム塩化物 80mg
塩酸リドカイン 800mg ナファゾリン塩酸塩 80mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 160mg 添加物：香料

使用上の注意 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)患部が広範囲の人(4)深い傷やひどいやけどの人**2.**使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ**3.**5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【用法に関する注意】(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること**(3)外用にのみ使用すること**

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限(底面に記載)をすぎた製品は使用しないこと



ボトル、ノズル：PE
キャップ、外装フィルム：PP
ラベル：OPP

製造販売元



タマガワ
玉川衛材株式会社

東京都千代田区岩本町2-2-16

<BC>

玉川衛材(株)お客様相談窓口
TEL. 03-3861-2037
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度
TEL. 0120-149-931

