

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ゴオウ配合感冒薬

ブロムミン[®]

ゴオウは、解熱、鎮痛作用があるとして種々の熱性疾患に用いられてまいりました。中国では、古くから滋養強壮剤の要薬として重用され、インドでは、仏教經典にその名がみられます。

風邪薬にゴオウを配合することにより、風邪特有の諸症状を緩和いたします。初期症状があらわれたときは、このゴオウ配合感冒薬をおのみいただいて、早めに治療することが大事です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないで下さい
5. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、
肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

(裏面に続きます)

肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

（２）５～６回服用しても症状がよくなりません

- ３．次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
□のかわき

適応症


かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

用法・用量 次の量を食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年 齢	１ 回 量	１日服用回数
15歳以上	２カプセル	３回
7歳以上15歳未満	１カプセル	３回
7歳未満	服用しないで下さい	

- （１）用法・用量を厳守して下さい。
（２）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
（３）カプセル剤の取り出し方。

図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



組成と作用 １日量６カプセル中に次の成分を含んでいます。

成 分	６カプセル中	主な作用
ゴオウ末	3mg	解熱、鎮痛作用があります。
ヘスペリジン	90mg	毛細血管を強くします。
リボフラビン	3mg	かぜの時に消耗しやすいビタミンB ₂ の補給。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ痛みをしずめます。
無水カフェイン	75mg	頭痛をしずめます。
クエン酸チペジン	60mg	せきをしずめ、たんをきります。
マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg	鼻水をおさえます。
dl-塩酸メチルエフェドリン	60mg	のどの痛みをやわらげせきをしずめます。

添加物：セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、バレイショデンプン、酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

〈成分に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- （１）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
（２）小児の手の届かない所に保管して下さい。
（３）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
（４）配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先 田村薬品工業株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル 0120-4193-95
受付時間10:00～17:00（土、日、祝日を除く）