

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

感冒薬  
葛根湯エキス配合

# 小児用 パブトン<sup>®</sup> ベビー

## ⚠使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないで下さい  
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい  
(眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないで下さい
- 長期連用しないで下さい



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関 係 部 位 | 症 状        |
|---------|------------|
| 皮 膚     | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消 化 器   | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系   | めまい        |
| そ の 他   | 排尿困難       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症 状 の 名 称                                               | 症 状                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                      | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)<br>中毒性表皮壊死症<br>(ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。           |
| 肝機能障害                                                   | 全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。                              |

(裏面に続きます)

## 間質性肺炎

空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）

ぜんそく

（2）5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

□のかわき

## 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

## 用法・用量

| 年 齢          | 1 回 量     | 1 日服用回数                                                                                                                       |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 歳以上 8 歳未満  | 8 mL      | 1 日 3 回食後および必要の場合は就寝前に服用するもの<br>とし、また場合によっては、1 日 6 回まで服用することと<br>しても差し支えありませんが 1 日 6 回服用する場合には、<br>原則として約 4 時間の間隔を置いて服用して下さい。 |
| 3 歳以上 5 歳未満  | 6 mL      |                                                                                                                               |
| 1 歳以上 3 歳未満  | 4 mL      |                                                                                                                               |
| 3 カ月以上 1 歳未満 | 2 mL      |                                                                                                                               |
| 3 カ月未満       | 服用しないで下さい |                                                                                                                               |

（1）用法・用量を厳守して下さい。（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。（3）1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。（4）本品に含まれている葛根湯エキスは、経時的に沈殿することがありますのでご使用の時はよく振ってお飲み下さい。

成分と作用 48mL中に次の成分を含んでいます

| 成 分                                                                                                                 | 48mL中 | 主な作用                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| 葛根湯エキス<br><div> 葛根 663mg 芍薬 249mg<br/> 麻黄 332mg 甘草 166mg<br/> 大棗 332mg 生姜 83mg<br/> 桂皮 249mg<br/> より製した水製エキス </div> | 680mg | 葛根湯は古くから、悪寒、発熱、頭痛がして首すじや背中がこわばるような症状に効果があるとされている漢方処方です。 |
| アセトアミノフェン                                                                                                           | 225mg | 熱をさげ痛みをしずめます。                                           |
| クエン酸チベピジン                                                                                                           | 20mg  | のどの痛みをやわらげます。                                           |
| マレイン酸クロルフェニラミン                                                                                                      | 2.5mg | 鼻水、鼻づまりに効果があります。                                        |
| 無水カフェイン                                                                                                             | 50mg  | 頭痛をしずめます。                                               |

添加物：白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、香料、プロピレングリコール、ゼラチン、グリセリン、パニリン、エチルパニリン、アルコール

## 保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）計量用カップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管して下さい。
- （5）使用期限を過ぎた製品は、服用しないで下さい。

お問い合わせ先 田村薬品工業株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル 0120-4193-95

受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

**田村薬品工業株式会社**

奈良県御所市西寺田50