

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

漢方製剤

医薬品

さむけ・発熱・ふしぶしの痛みのあるかぜの初期症状に

ルル[®]内服液〈麻黄湯〉

麻黄湯は、漢方薬の原典である「傷寒論」^{しょうかんろん}に記載されている漢方薬です。

《ルル内服液〈麻黄湯〉》は、

- そのエキスをのみやすくしたドリンクタイプで、すぐれた効き目があります。
- さむけや発熱、身体のだるさの痛みのあるかぜに優れた効果を発揮します。
- 麻黄の持つ発汗作用と利尿作用によって、かぜの諸症状を改善します。
- 眠くなりにくい漢方製剤です（眠くなる洋薬成分が入っていません。）。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないで下さい
体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 胃腸の弱い人
(4) 発汗傾向の著しい人
(5) 高齢者
(6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(7) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体のだるさが痛い場合の次の諸症：

感冒、鼻かぜ

■ 用法・用量

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1 本	3回 食間に服用して下さい
15 歳 未 満	服用しないで下さい	

服用前によく振ってから服用して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 本品は1回1本飲みきりです。

■ 成 分

3本(90mL)中に次の成分を含んでいます。

麻黄湯エキス……………3,100mg

〔マオウ……5.0g キョウニン…5.0g〕より得た軟エキス
〔ケイヒ……4.0g カンゾウ……1.5g〕

添加物：ハチミツ、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料、ミツロウ、アルコール

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
4. 本剤には生薬エキスが配合されているために、まれに沈でんを生じることがありますが、薬効には変わりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店
又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電 話 03 (6667) 3232
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ルルについて詳しくは <http://www.lulu.jp/>

05 ㊞登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋小網町1-8

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元
田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50