

みずむし・たむし用薬

ピロエスW[®] パウダー スプレー

抗生物質

+

抗真菌剤

+

鎮痒剤

配合
70g

第2類医薬品



Daichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。

第2類医薬品

△ 使用上の注意

× **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

(1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等 (2)しっしん (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

△ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)乳幼児 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人 (5)患部が化膿している人 (6)しっしんがみずむし、いんきんたむし、ぜいにたむししかがみずむし、いんきんたむし、ぜいにたむししがある場合は、しっしん等他の原因による場合が多い

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、ただれ、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 使用後、症状がかえって悪化した場合(ただれたり、化膿したり、病巣が使用前より広がる等)は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たった所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG

火気厳禁 第一石油類 10mL ⑧登録商標
使用期限、製造番号は底面記載

ピロエスWパウダースプレー

〈効能・効果〉 みずむし、いんきんたむし、ぜいにたむし
〈使用法〉 1日2～3回、適量を患部に噴霧して下さい。
〈使用法に関連する注意〉 (1)使用法を厳守して下さい。(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。(3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けて下さい。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。(5)外用にのみ使用して下さい。(6)使用前によく振ってから使用して下さい。(7)患部まで約10cmの距離で噴霧して下さい。(8)凍傷になる恐れがあるので、同じ箇所に連続して1秒以上噴霧しないで下さい。(9)内容物の残量が少なくなつたときに、缶を横向き状態で使用すると、出にくくなる場合があります。

よく振ってから使用して下さい。

〈成分・分量〉 70g中 ピロールニトリン20mg(ケル)、クロトリマゾール40mg、クロタミソール500mg、イメノール100mg、添加物：ソルビタンセスキオレイン酸エステル、トウモロコシデンプン、二酸化ケイ素、酸化チタン、ジソプロパノールアミン、エタノール、LPG **〈成分・分量に関連する注意〉** (1)本剤はアルコールを含んでいますのでしめしすることがあります。(2)塗布後ほてり(熱感)を感じることがありますが、短時間のうちに消失します。

〈保管及び取扱い上の注意〉 (1)直射日光の当たらない所に保管して下さい。(2)小児の手が届かない所に保管して下さい。(3)火気に近づけないで下さい。(4)本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メカネ等につかないようにして下さい。(5)缶底に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。(6)捨てるときには、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いて下さい。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8234
東京都中央区日本橋3-14-10
お問い合わせ先 お客様相談室
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00
(土、日、祝日を除く)
<http://www.daichisan-kyo-hc.co.jp/>



キャップ：PP
外装フィルム：PP
金属：缶

