

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

かぜ薬

医薬品

ハイセーフ[®]S 顆粒

登録商標

小柴胡湯配合

ハイセーフS顆粒は、漢方薬、解熱鎮痛剤、鎮咳剤などを配合し、悪寒、発熱、のどの痛み、せき、鼻水、頭痛などのかぜにともなう不快な諸症状を効果的に緩和する総合かぜ薬です。
ハイセーフS顆粒に含まれている小柴胡湯は、かぜの後期症状に効果の高い漢方薬として知られています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと

- ① 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)。

3. 服用後、乗物または、機械類の運転操作をしないこと

(眠気があらわれることがある)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- ① 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- ② 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ③ 授乳中の人。
- ④ 高齢者。
- ⑤ 本人または家族がアレルギー体質の人。
- ⑥ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ⑦ 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- ⑧ 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- ⑨ インターフェロン製剤で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

① 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群、 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診察を受けること。)
ぜんそく	

② 5～6回服用しても症状がよくなりません。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は、増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

便秘、口のかき

<効能・効果>

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

<用法・用量>

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に水またはお湯で服用してください。

	15才以上	11～15才未満	7～11才未満	3～7才未満	1～3才未満	1才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用しないこと
						×

用法・用量に関する注意

- ① 定められた用法、用量を厳守してください。
- ② 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ③ 1才未満の乳幼児には使用しないでください。

<成分・分量>

1日量（3包）中

成 分	分 量	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
dl-塩酸メチルエフェドリン	60mg	気管支を広げ、せきをおさえます。
リン酸ジヒドロコデイン	24mg	せきの中枢に作用して、せきをしずめます。
グアイフェネシン	250mg	たんを出やすくして、せきを軽くします。
マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg	せき、たん、鼻みずの原因となるアレ르기ー症状をおさえます。
無水カフェイン	75mg	各成分の働きをたすけ、ねむけを除きます。
小柴胡湯エキス末 小柴胡湯（6.05gに相当）	500mg	かぜの後期症状を、緩和します。

添加物：セルロース、乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mg、サッカリンNa、ヒドロキシプロピルセルロース

保管及び取り扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 1包を分割し、残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- ④ 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- ⑤ 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

かぜの養生法

1. 無理せず、安静第一を心がけましょう。安静にすることは、体力の回復とともに、かぜの治療を早めます。
2. 食事はビタミン・カロリーの多いもの、消化の良いもの、あたたかいもの、水分の多いものをとるように心がけましょう。
3. 入浴は熱が下がってから1～2日後にしましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。

大昭製薬株式会社 おくすり相談室

電話 0748-88-4181

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）