



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本標準商品分類番号
87118

小柴胡湯エキス配合かぜ薬

ヘルビック®S顆粒

第②類医薬品

ヘルビックS顆粒は、『かぜ』のときの鼻水、のどの痛み、せき、たん、発熱、頭痛などの症状にすぐれた効果をあらわす6種の成分と、昔から『かぜ』のときに用いられている小柴胡湯のエキス末を配合した、のみやすい顆粒の総合かぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
(9)インターフェロン製剤で治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

- (2)5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、口のかわき

ヘルビック®S顆粒

第②類医薬品

■成分・分量

成 分	1包(1.6g)中含量	はたらき(作用)
アセトアミノフェン	300mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みなどをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
グアイフェネシン	83.3mg	たんをきれやすくします。
無水カフェイン	25mg	頭痛をやわらげます。
小柴胡湯エキス末	166.7mg (小柴胡湯2.02gに相当)	かぜに伴う熱感、悪寒、頭痛などの症状に効果があります。

- 添加物として、セルロース、乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mg、サッカリンNa、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

■効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■用法・用量

次の1回量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	年 齢	1回量
15歳以上	1包	11歳以上15歳未満	2/3包
7歳以上11歳未満	1/2包	3歳以上7歳未満	1/3包
1歳以上3歳未満	1/4包	1歳未満	服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法、用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■包装 9包、18包

<製品情報問い合わせ先>

明治製菓株式会社 くすり相談室：電話(03)3273-3474
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

<副作用被害救済制度の問い合わせ先>

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

発 売 元

明治製菓株式会社

104-8002 東京都中央区京橋2-4-16

製造販売元



大昭製薬株式会社

520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

Q-HRS